

FORTEbeta FENOL



Pomocný rostlinný přípravek			
Nitrofenoláty draselné s živinami			
složka		obsah (g/l)	obsah (%)
4-nitrofenolát draselný		0,49	0,037
2-nitrofenolát draselný		0,33	0,025
5-nitroguajakolát draselný		0,16	0,012
N celkový, z toho	vodorozpustný celkový dusík	240	17,9
N močovinový	vodorozpustný močovinový dusík	200	14,9
N nitrátový	vodorozpustný nitrátový dusík	40	3,0
MgO	vodorozpustný oxid hořečnatý	57	4,2
B	vodorozpustný bór v komplexu s MEA	15	1,11
Mo	vodorozpustný molybden	5	0,37
Mn	vodorozpustný mangan v chelátu s EDTA	5	0,37
Zn	vodorozpustný zinek v chelátu s EDTA	5	0,37
Zvláštní pokyny pro používání: Používat pouze v případě skutečné potřeby, nepřekračovat doporučené dávkování. Používá se formou mimokořenové aplikace postřikem na list rostlin.			
Obsah balení: 27 kg; 540 kg; 1350 kg (tj. 20 litrů; 400 litrů; 1000 litrů)			
Výrobce: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic			

Podmínky skladování: Skladujte odděleně od potravin, mimo dosah dětí a v původních obalech. Doba použitelnosti: 18 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování. Hnojivo skladujte v původním balení, v zastřešené místnosti, při teplotě v rozmezí -15 až +30 °C. Maximální množství vrstev při skladování: kanystry 20 litrů - 3 vrstvy • kontejner 1000 litrů – 2 vrstvy

Rozsah a způsob použití:

Pomocný rostlinný přípravek je určen pro aplikaci na list do všech zemědělských plodin.
Hektarová dávka: 4 l/ha (5,4 kg/ha)

Při aplikaci dbejte těchto zásad:

1. Nepřekračujte doporučenou koncentraci živného roztoku (viz tabulka níže).
2. Neaplikujte při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejití rosy) nebo pozdně odpolední aplikace, postřik před deštěm nebo za deště není účinný.
3. Neaplikujte na porosty bez aktivní listové plochy (fyziologicky, či mechanicky poškozené, zničené chorobami a škůdci).
4. Připravenou postřikovou jichu za stálého míchání ihned aplikujte až do úplného spotřebování.

Doporučená aplikace:

plodina	termín aplikace	dávka (l/ha)	doporučená dávka vody (l/ha)
olejniny	od 2. listu do konce kvetení	4	120 - 400
luskoviny	od 2. listu do konce kvetení	4	120 - 400
okopaniny	od 2. listu do uzavření porostu	4	120 - 400
kukuřice	od 2. listu do konce kvetení	4	120 - 400
vinná réva	od 3. listu do zaměkání bobulí	4	150 - 800
ovocné plodiny	od počátku vývoje listů	4	300 – 800
zelenina	od počátku vývoje listů	4	150 – 600

Při opakované aplikaci dodržte odstup mezi aplikacemi nejméně 14 dnů.

FORTEbeta FENOL obsahuje látky významně podporující regeneraci rostlin, příjem živin a jejich následnou využitelnost pro růst a vývoj rostlin. Nejvyššího efektu se dosahuje při aplikaci po provedeném dusíkatém hnojení a dešťových srážkách.

Při kombinování s dalšími hnojivy a přípravky na ochranu rostlin vždy proveďte zkoušku mísitelnosti. FORTEbeta FENOL přidáváme jako poslední složku. Nikdy nevytvářejte směs z koncentrovaných složek!

Obsah rizikových prvků: nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb. (v mg/kg): Cd 1,0, Pb 10, Hg 1,0 As 10, Cr 50.

AGRA servis: www.agra.cz, tel.: +420 383 399 737

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při práci s přípravkem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc:

Při zasažení očí: okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí: vypít bezprostředně po požití 0,5 litru vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Způsoby zneškodňování látky/přípravku:

Zbytky přípravku (případně oplachovou vodu) shromážděte k opětovnému použití při postřiku.

Hnojivo se dodává balené.

Datum výroby/číslo výrobní šarže: