

**POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN**  
**Před použitím si přečtete příložený návod k použití**

## **Peridiam® Quality 208**

Pasivní pomocný prostředek modré barvy pro zvýšení přilnavosti mořidel na osivu řepky olejky a hořčice, snížení jeho otěru při transportu a manipulaci a pro zvýraznění barevnosti osiva ve formě kapalného suspenzního koncentrátu pro moření osiva.

<b>Název a množství účinné složky:</b>	<b>kopolymer vinyl acetát/dibutyl maleát 100 g/l (8,93 %)</b>
--	---

P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P501	Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
EUH208	Obsahuje směs isothiazolonů. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210	Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
SP1	Neznečišťuje vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
<b>Držitel povolení:</b>	Bayer S.A.S. 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon, Francie
<b>Výrobce:</b>	Bayer S.A.S., Bayer CropScience, 14 rue de la Pierre-Follège, F-91660 Merville, Francie
<b>Právní zástupce/dodavatel/osoba odpovědná za konečné balení a označení:</b>	BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5; tel.: 266 101 111

® je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer

<b>Evidenční číslo:</b>	<b>1786-0C</b>
<b>Číslo šarže:</b>	uvedeno na obalu
<b>Datum výroby formulace:</b>	uvedeno na obalu
<b>Doba použitelnosti:</b>	při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby (teplota skladování +5 až +30 °C)
<b>Množství pomocného prostředku v obalu:</b>	<b>5 L, 10 L, 15 L v kanystru HDPE</b> <b>200 L v sudu HDPE</b> <b>500 L, 1000 L v kontejneru HDPE</b>

### **Způsob působení**

Peridiam Quality 208 je pasivní pomocný prostředek, který zlepšuje technologické vlastnosti namořeného osiva. Přispívá k rovnoměrnějšímu rozmístění mořidel na vnějším povrchu semen a optimalizuje jejich přilnutí na osivu. Hladší povrch ošetřeného osiva zlepšuje jeho syponost a redukuje možnost otěru osiva při transportu a manipulaci. Namořené osivo se vyznačuje nižší prašností a zvýšenou barevností.

## Návod k použití

Plodina	Účel použití	Dávkování	OL	Poznámka k dávkování
řepka olejka, hořčice	zlepšení technologických vlastností osiva	3-6 l/t osiva	--	s mořidly společnosti Bayer

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje

Plodina	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
řepka olejka, hořčice	moření	1x

## Upřesnění použití

Peridiam Quality 208 je třeba použít v souladu s návodem na použití příslušného mořidla. Viz dále Další údaje a upřesnění.

## Další omezení

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.

Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty OOPP, které nelze prát.

Při provádění aplikace nepoužívejte kontaktní čočky.

## Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Při práci použijte osobní ochranné pracovní prostředky doporučené pro dané mořidlo, se kterým se pomocný prostředek používá.

Při práci se samotným pomocným prostředkem použijte tyto osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP):	
Ochrana dýchacích orgánů:	není nutná
Ochrana rukou:	gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s kódem podle ČSN EN ISO 374-1
Ochrana očí a obličeje:	není nutná
Ochrana těla:	celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688
Dodatečná ochrana hlavy:	není nutná
Dodatečná ochrana nohou:	pracovní nebo ochranná obuv podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347
Společný údaj k OOPP:	Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

## Informace o první pomoci

Dodržujte pokyny pro první pomoc pro dané mořidlo, se kterým se pomocný prostředek používá.

**Při manipulaci se samotným pomocným prostředkem dodržujte tyto pokyny:**

<u>Všeobecné pokyny:</u> Projeví-li se zdravotní potíže (např. podezření na alergickou kožní reakci) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.	
Při nadýchání:	Přerušete práci. Přejděte mimo exponované prostředí.
Při zasažení kůže:	Umyjte se vodou a mýdlem.
Při zasažení očí:	Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.
Při náhodném požití:	Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: **Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402 ([www.tis-cz.cz](http://www.tis-cz.cz))**.

## **Skladování**

Pomocný prostředek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách +5 až +30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

## **Likvidace obalů a zbytků**

Případné zbytky mořící kapaliny nebo oplachové vody nesmějí zasáhnout zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.

Použité obaly od pomocného prostředku se nesmějí používat k jinému účelu!

Prázdné obaly se 3x vypláchnou vodou a po znehodnocení se předají oprávněné osobě k odstranění.

Případné nepoužité zbytky přípravku, včetně pytlů od namořeného osiva a zbylého prachu se rovněž předají oprávněné osobě k odstranění.

## **Další údaje a upřesnění**

### **Upřesnění použití**

Peridiam Quality 208 se aplikuje v průběhu moření osiva a v souladu se schválenými technologickými postupy platnými pro moření osiva řepky olejky, hořčice a na k tomuto účelu vhodných mořících zařízeních. Peridiam Quality 208 se míchá s mořidly a vstupuje do moření ve formě tank-mixu.

Osivo ošetřené Peridiam Quality 208 nedoporučujeme opětovně mořit.

Při přípravě směsi se do cca 80 % plánovaného množství vody přidá za stálého míchání Peridiam Quality 208 a míchá se po cca 30 minut. Poté se do směsi přidají mořidla. Nejprve se přidávají tekutá mořidla, poté prášková. Nakonec se přidá zbývající množství vody, kterou se propláchnou nádoby od použitých přípravků. Znovu se míchá 10 minut a potom se zahájí dávkování mořící směsi. Mořící směs je nutno homogenizovat mícháním po celou dobu moření. Připravenou směs je nutno bezodkladně spotřebovat.

### **Čištění mořícího zařízení**

Provádí se v souladu se schválenými technologickými postupy platnými pro daný typ mořičky.

### **Dodatková informace společnosti Bayer:**

**Pomocný prostředek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.**

**Pomocný prostředek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu této etikety anebo v písemných doporučeních společnosti Bayer, platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin.**

**V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost jednotlivých zamýšlených složek.**

**Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené odlišným použitím či nesprávným skladováním pomocného prostředku.**