

**WUXAL® Sulfur****HNOJIVO ES**

Typ hnojiva: C.1.1 Kapalné dusíkaté hnojivo N (SO<sub>3</sub>) 15 (52,5) se stopovými živinami, s nízkým obsahem biuretu

**Obsah živin:**

% hmotnostní	živina
15,0	N - Dusík - celkový (198 g/l)
9,2	amonný dusík (121 g/l)
5,8	močovinový dusík (77 g/l)
52,5	vodorozpustný oxid sírový (SO <sub>3</sub> ) (693 g/l)
0,01	B vodorozpustný bor (0,132 g/l)
0,004	Cu vodorozpustná měď v chelátu s EDTA (0,052 g/l)
0,02	Fe vodorozpustné železo v chelátu s EDTA (0,264 g/l)
0,012	Mn vodorozpustný mangan v chelátu s EDTA (0,158 g/l)
0,001	Mo vodorozpustný molybden (0,013 g/l)
0,004	Zn vodorozpustný zinek v chelátu s EDTA (0,052 g/l)

**Čistá hmotnost:** 26,4 kg

**Výrobce:** AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdter Landstr. 199, D-40549 Düsseldorf, Německo.

**Pokyny pro použití:**

Wuxal Sulfur má kromě obsahu dusíku a všech stopových mikroživin i velmi vysoký obsah síry. Toto složení živin je obzvláště důležité pro syntézu proteinů, neboť síra i dusík jsou obsaženy v aminokyselinách, jako je methionin a cystein. Síra a dusík jsou známé svým synergickým účinkem na metabolismus rostlin. Síra je také zapojena v odolnosti rostlin vůči chorobám. Všechny kationtové stopové prvky jsou plně a silně chelátované, a proto dobře dostupné pro příjem listy a transport uvnitř rostliny.

Upozornění: Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Objem balení: 20 l

**Dávkování a podmínky používání:**

Nejlepší účinku je dosaženo, když je Wuxal Sulfur aplikován brzy ráno nebo v podvečer, nebo když je zataženo.

plodina	dávka	poznámka
řepka olejka	3 – 5 l/ha	1. v průběhu vývoje listové plochy (podzimní aplikace stádium 4-6 listů pro ozimou řepku olejnou) 2. na začátku prodlužovacího růstu
obilniny (ozimá pšenice, ozimý ječmen)	3 – 5 l/ha	1. odnožování 2. začátek prodlužovacího růstu až do prvního kolínka
kukuřice	5 l/ha	1. stádium 4-6 listů 2. stádium 10 listů
cukrovka	3 – 5 l/ha	1. stádium 4-6 listů 2. stádium 6-8 listů
košťálová zelenina	3 - 5 l/ha	1. stádium 6-8 listů 2. opakovat po 10 dnech
cibule, česnek	3 – 5 l/ha	1. 5 nebo několik listů viditelných 2. začátek tvorby cibule
špenát	5 l/ha	1. v průběhu vývoje listů (hlavního výhonku) 2. dva týdny před sklizní
salát	3 – 5 l/ha	1. v průběhu vývoje listů (hlavního výhonku)

		2. dva týdny před sklizní
--	--	---------------------------

Při aplikaci na řepku olejku a košťálovou zeleninu doporučujeme aplikovat směs hnojiva Wuxal Sulfur s 3 - 5 l/ha hnojiva Wuxal Oilseed.

Nedoporučujeme aplikovat v průběhu kvetení nebo zrání.

### **Mísitelnost, příprava postřiku.**

Wuxal Sulfur je mísitelný s většinou pesticidů. Pro postřik doporučujeme použít dostatečné množství vody 400 l / ha.

I když Wuxal Sulfur je kompatibilní s většinou běžně používaných pesticidů, při prvním použití hnojiva doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti

Při plnění nádrže postřikovače dodržet následující postup.

1. Do nádrže dát cca. 1/2 celkového množství vody.
2. Zapnout míchání.
3. Přidat odměřené množství Wuxal Sulfur. Pečlivě vypláchnout obal a přidat do nádrže.
4. Podle potřeby přidat jiné typy Wuxal
5. Poté podle potřeby přidat pesticidy.
6. Nádrž doplnit vodou na stanovený objem
7. Připravená směs musí být čím dříve vystříkána, nemůže být připravována do zásoby.

### **Pokyny pro skladování a manipulaci:**

Hnojivo je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzamčených a chladných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek. Chraňte produkt před znečištěním, vyschnutím a před mrazem, teplotami pod +5°C a nad +40°C. Doporučuje se uskladnit produkt tak aby byl chráněn před vlivy počasí, slunečním zářením, přehřátím a znečištěním. Zabraňte většímu kolísání teplot.

### **Bezpečnostní opatření:**

Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po práci si omyjte ruce a obličej. Ochrana dýchacích orgánů je potřebná proti aerosolům při aplikaci. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

### **První pomoc:**

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

### **Při nadýchání aerosolu při aplikaci:**

Pacienta okamžitě vynést ze zamořené místnosti a nechat jej odpočívat na dobře větraném místě. Lékařské vyšetření je potřebné jestliže postižený má problémy s dýcháním.

### **Při zasažení kůže:**

Svlékněte kontaminovaný oděv. Postiženou část kůže neprodleně důkladně omýt mýdlem a dostatečným množstvím vody. V případě potřeby přivolejte lékaře.

### **Při zasažení očí:**

Důkladně vymýt oči při plném otevření očních víček pod tekoucí vodou. Kontaktní čočky sundejte pokud je postižení používá. V případě potřeby přivolejte očního specialistu.

### **Při náhodném požití:**

Okamžitě vypláchněte postiženému ústa vodou a následně podejte velké množství vody. V případě přetrvávajících potíží přivolejte lékařskou pomoc.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci.

V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

**Datum výroby:** uvedeno na obalu

**Číslo šarže:** uvedeno na obalu

**Distributor:** AGRO ALIANCE, s.r.o. V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel.: 257 830 138

**OZNAČENÍ:**

Směs není označena jako nebezpečná dle Nařízení 1272/2008 ES (CLP)